



BOVIKALC®


Mineraal dieetvoer

Vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcemie

Voor melkkoeien rond het kalven

Snel en langdurige calcium vrijgave

Plaats een bolus met de ronding aan de bovenkant in de applicator. Goed duwen zodat de bolus er niet uit kan vallen.




Plaats u naast de koe en houd haar bovenkaak vast. Houd de kop van de koe omhoog en een beetje naar u toe gedraaid.



Breng de applicator met bolus in de mond van de koe. Bij het voelen van een lichte weerstand aan de basis van de tong, duwt u de applicator voorzichtig nog verder.



Zodra de applicator volledig in de mond zit, op de stamper duwen zodat de bolus vrij komt. De applicator terug uit de mond van de koe halen.



Bijzonder voedingsdoel

Vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcemie.

Essentiële voedingskenmerken

Hoog gehalte aan calcium in de vorm van in hoge mate beschikbare calciumzouten. Bovikal[®] bevat calciumchloride, dat snel oplost in de pens en calciumsulfaat, dat pas oplost na degradatie door de pensflora.

Samenstelling

Calciumchloride (71 %), calciumsulfaat (29 %), mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur.

Toevoegingsmiddelen

Informatie te verkrijgen bij de verdeler.

Analytische bestanddelen: Calcium (22,2 %), water (32,0 %).

Iedere bolus bevat 43 g calcium.

Bovicalc® bevat geen natrium, fosfor of magnesium.

Aanbevolen gebruiksduur

Vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

Toediening

Bovicalc® wordt oraal toegediend met een daarvoor bestemde applicator.

Aanbevolen dosering: 4 boli

- Bolus 1: bij de eerste tekenen van een naderende kalving
- Bolus 2: onmiddellijk na het kalven
- Bolus 3: 12 -24 u na het kalven
- Bolus 4: 24-48 u na het kalven

Minimum dosering: 2 boli

- Bolus 1: onmiddellijk na het kalven
- Bolus 2: 12-24 u na het kalven

Als supplement bij calciuminfuus: 2 boli

- Bolus 1: 2 - 3 u na het infuus
- Bolus 2: 12 - 15 u na bolus 1

Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Bovicalc® enkel toedienen met een aangepaste applicator.

Niet toedienen aan koeien met klinische tekenen van melkziekte omdat hun slikreflex verstoord zou kunnen zijn. Niet toedienen in geval van paresis (verlamming).

Alvorens toe te dienen moet u erop letten dat de bolus in goede staat is (de beschermlaag moet intact zijn).

Bewaring

Bewaar Bovicalc® bij een temperatuur beneden 30° C.

Elke bolus moet in zijn oorspronkelijke verpakking bewaard blijven tot juist vóór de toediening, aangezien gevoelig voor luchtvochtigheid.

Ten minste houdbaar tot: zie "EXP".

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
208-R854833

Distributeur Nederland

Boehringer Ingelheim Animal Health
Netherlands B.V.,
Basisweg 10,
1043 AP Amsterdam
Tel : +31 (0) 20 799 6950
Reg. no. NL213848 GMP007996

Distributeur België/Belgique – Luxemburg/Luxembourg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 (0)2 773 34 56
HN100717

Bovicalc® is een geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH – gebruikt onder licentie.